

AValiação DA QUALIDADE DE VIDA PARA AS DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS DE PACIENTES REABILITADOS COM IMPLANTES E PRÓTESES FIXAS. UMA REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA.

Giovana Borghi Paulini¹,
Aline Barbosa Ribeiro²,
Adriana Barbosa Ribeiro³.

1 Graduanda do curso de Odontologia do Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva (IMES).

2 Doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e Docente do Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva (IMES).

3 Doutora em Reabilitação Oral pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Professora Colaboradora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP-USP).

Autor de Correspondência:

Giovana Borghi Paulini

e-mail: giovana_paulini@hotmail.com

Avenida Daniel Dalto s/nº (Rodovia Washington Luis - SP 310 - Km 382) | Caixa Postal 86 | 15.800-970 | Catanduva-SP.

Introdução: Estudos mostram que pacientes edêntulos reabilitados com próteses removíveis totais ou parciais apresentam menor qualidade de vida que pacientes que recebem próteses fixas sobre implantes. Merece destaque fatores como socialização, função mastigatória, baixa autoestima, má adaptação e trauma nas mucosas orais. Quando avaliados, após a cirurgia de inserção de implante dentários e a confecção de próteses fixas, os pacientes relataram uma melhora nos pontos negativos apresentados e uma qualidade de vida melhorada. **Objetivos:** Identificar, por meio de uma revisão narrativa de literatura, a qualidade de vida de pacientes em diferentes faixas etárias reabilitados com implantes e próteses fixas, em detrimento de condições iniciais com o uso de próteses removíveis. **Material e Métodos:** Esta revisão narrativa foi realizada, a partir de buscas nas bases de dados *PubMed*, *Google Scholar* e *Scopus*, utilizando as palavras-chaves “*Quality of life*”, “*implant dentistry*”, “*complete dentures*”, “*dental implants*”, “*fixed prosthesis*”, de forma individual e associados por meio de operadores booleanos “*and*”, “*or*” ou “*not*”, sem restrição de ano e sempre utilizando a língua inglesa. Dois revisores independentes examinaram os títulos/resumos e realizaram a inclusão inicial. Após a leitura de textos completos para exclusão final, os artigos incluídos na avaliação final serviram para a extração dos dados, mediante a análise da variável primária: qualidade de vida relacionada à saúde bucal (QVSB). **Resultados:** Na busca inicial, foram encontrados 269 no *Pubmed*, 198 no *Google Scholar* e 20 artigos no *Scopus*. Destes, após a leitura do título e resumo, apenas 34 abordaram o tema proposto. Após leitura completa dos artigos, 13 foram incluídos nesta revisão. **Conclusão:** A qualidade de vida dos pacientes edêntulos, após a realização da cirurgia de inserção dos implantes dentários e da prótese imediata é melhorada, quando comparada ao uso da prótese removível convencional. Entretanto, a qualidade de vida dos pacientes após a fixação de próteses fixas sobre implantes parece não ter influência de diferentes faixas etárias.

Palavras-chaves: “qualidade de vida”, “implantes odontológicos”, “Próteses e Implantes”.